

**DE
HYSTEROTOMOTO
CIA SEU DE
SECTIONE
CAESAREA...**

Giovanni Crescini



177.
23

DE
HYSTEROTOMOTOCIA
SEU

DE SECTIONE CAESAREA

Dissertatio Inauguralis

AUCTOR

APRILIORE MEDICINAE PRAECEPTOR
ILLUSTRISSE FACULTATIS DIRECTOR, SPESALTI D. DONALD
AC CATHEDRAE P. S. PROFESSOR

AUSPICE

FRANCISCO MARABELLI

CHEMIAE PROFESSOR O.

PRAE DOCTORUM MEDICINAE LICENTIA ET DE CLASSE

IN CELEBRATIONE L. S. ACHISTOMACHII THOMAE

MENSE AUGUSTO AN. MDCCCXXX.

VIA CIVI TERMINI JOSEPH

PUBLICE INQUISITIONE SUBSCRIPSI

JOANNES CRESCINI

CHIRURGIAE DOCTOR

ATQUE OBSTETRICAE ARTIS MAGISTER.

EX AULA MANTUANA.

X

Eximi Regii

EX TYPOGRAPHIA PERI ET SOCI.



Francis

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

*De Hysterotomotocia,
seu de sectione Caesarea.*

Antiquitatis celebre est illud Galeni dictum (1): *Oparetur prius de nominibus disserere, quae incident nobis necessario in habendo sermone; et tentae utilitatis esse nomina disquisitionem tentat creditus Scaligerus, ut ex ipsius cognitione sepe numero in rei perceptionem perveniamus, unde quoque: initium doctrinae esse nominis considerationem, inquit idem, et recte. Quare et nos prius quam ad realem nostri affectus considerationem perveniamus, praemittimus ea, quae nominis explicitiori inserere poterant, ut hinc praemissis, facilius nobis ad ejus notitiam potest aditus.*

Hysterotomotocia est vox composita ex vocabulo graeco *ὕστερον*, quod significat uterum, et

(1) Cap. 8.

ex particulis *capae* (scor) et *terre* (perio): infans dicitur *Scor* *Cacare*; quo scilicet foetus per cruciatum abdominis et uteri aperturam extrahitur. Ubi vero simpliciter abdominis sectione factus in lucem editur, aliqui *gastroteronem* vocant, licet minus propria. De origine tamen hujus denominationis Auctores non conveniunt. Alii ipsam restringunt ad natiuitatem *Jahi* *Cacare*; alii *Cacare*, vel *Cacare* vocare solent individuum sic nati, ex eo quod cuncto utero in lucem procedant. Sic olim *Scipionem Africanum* primum ex utero eductum *Scor* testatur antiquitas; similique modo natum et *Mandum*, qui *Carthagem* cum exercitu intravit, *Phalar* (1) et alii referunt. Alii *Cacare* a *Cacare* appellatos solvere contendunt: sed ne hic diutius immoremur, illa sectio in tribus instituta legitur casibus: primus est, cum foetus obit, et mater vivit: secundus, cum mater mortua est et foetus vivit; tertius cum mater et foetus vivunt: qui haec duobus ultimis modis vivi educuntur, *Cacare* nomenclatur.

Foetus mortui gratis raro sectio ita instituitur in viva matre, cum mortis ipsius in utero existentis fallacia sint indicia, et quatenus mortuus pro certo videretur, naturae opus relinquatur, et per autem obstetriciam adjuvatur ejusdem exclusio. Si vero per vias naturales partes ullo modo fieri nequeat, et matris vias perditatur, ad operationem foret procedendum. Haeciam rationem gestationis foetus mortui in utero per ab-

(1) Hist. Rom. lib. 7. cap. 9.

nos quatuor, et tandem ex abdomine secto et utero membratum extracti, salva matre et fecunda manente, sed propter neglectam viam iterum sectionem mortui refert *Marchius Cernar* (1). Sic et *Mongerus* (2) vidit mulierem quampiam, ex cujus latere dextero, postquam factum mortuum per aliquot annos in utero gessisset, extatus est tumor, ex quo aperto extracta fuere foetus una adeo corrupta, ut mephitem intolerabilem longe spargerent: sanata tamen est illa, et per plures annos supervixit. Barisinae autem via est ipsa natura sua sponte per vias alienas factus exclusioem moliri; cujus tamen causa memorandam habet historiam *Bartholinus* (3) de muliere, quae primo ex umbilico tumido, ac dissecto, deinde ex apothecae laeve umbilicem aperto, ac tandem ex ulcere in illo sinistro suborto, plurima foetus humani conicula non simul et simul, sed diversis vicibus, imo diversis multamque inter se distantibus annis excrevit, eaque tam multa, ut pro gemellorum cubus sufficere potuissent. *Affricanis* (4) historiam gravidae narrat non vulgarem, quae mortuo eo, quod intus habebat, grvida denso evasit: hoc quoque, quod secunda vice conceptum est, extincto, ac nuda abdomen remanente, haud ita multo post per umbilicum erexit abominum, ex quo eo stupente, haud modo prius, sed etiam ante prodirent: se secum perpenas, ea ad foetum pertinuissae deprehendit,

(1) *Enchiridion seu Compend. med.* pag. 188.

(2) *Wilsch. Chirurg. T. 3. p. 408.*

(3) *Lib. de faciliis partus via.*

(4) *Lib. 2. Chirurg. cap. 74.*

atque eorum multa exempla. Mulier iterum complures postea uices vixit, aliam tamen, ex quo humor perpetuus emanabat, eo loci habuit. — *Alexander Benedictus* similem narrat historiam hunc in modum: « mirum obiter naturae exemplum refertur ejusdam mulieris, laeta uxoris » ventrem cum partum legitimum emiserit, aliter » inclinata manebat mortua, qui in magnis parturientis difficultatibus tabescentes, floore quodam » profuit ex naturalibus oris; dentem oris in » ventre tribus fistulis, ex una, quae omnium » maxima erat, integra infantis calvaria extracta » est cunctis mirandis; deinde singulis diebus » reliqua cum desumpta sunt: unde mirabili modo » turne opt sanitati restituta est » (1). Ceterum quando foetus extra uterum haerent, florem variis rariisuntur: alii receptaculo suo perrepto, in matris abdomen effunduntur: alii abrenatum excutunt, atque per eandem apertam frustum quandoque cutem moluntur: alii excutuntur, dura cyrtide coen includuntur, Delopandam tunc dicti; vel ab aliis graviditas perennis (2). — Aliquando in suo liquore solvantur.

Foetus vivi e mortua mater sectione extracti (3) innotescunt exempla tam apud veteres, tum

(1) De Curand. morb. lib. 26. c. 12.

(2) V. Nodden Med. Leg.

(3) Prochurus Professor Platner contendit, e vera corruptione fuisse mortis mulieris, e quibus foetus vivi sectione extractos eductantur, et sanari illum mortem non esse nisi adparitum, ubi necesse est hoc aliquem morbum gradum corruptionis organice, qui etiam sufficit per se ad foetus expulsiorem efficiendam. — Fieri quoque aliis hinc ardeat mentibus.

apud nativitas hodiebus exant (1); nec mirum, cum et religio et humanitas dicant saluti foetus, quoad fieri potest esse consulendum: quo dicta operatio citius a morte matris instituitur, eo major vitae superstitis foetus spes habetur, quoniam tamen si motus grvida per aliquod tempus operationem distulerint, de vita foetus non ut desperandum, non *Dobson* (2) in grvida, apoplexia mortua, et altera die (3) motus foetus percrepuit tentatur. Anno 1567 die 14 Junii ab *Hoperna* maritus et uxor grvida suspendebantur. Uxor cum pendisset per horas quatuor gemellos vivos jam mortuos peperit (4). Ex utero grvidae foras hinc a matris pluribus vulneribus confosam (referente *Congiamila*) (5) 48 horas post mortem sectione eductus fuit foetus in pede per uterum confosam vulneratus, qui adhuc per quadrantem horae supervixit. Exemplum foetus nullus pro certo mortuus habendus, nisi a causa ipsa interna jam potredinem supervenisse constet si excipias causas congelationis distensionis matris grvidae, aut excitationis, injurias externae lethalius matri et foetui illatae: unde etiam quandoque a multis pro mortuo habetur, cum motibus erraticis prius sit, sub conditione sacro baptismatis fonte ut abluendus

(1) V. *Schrockius*, *Heimerus*, *Bandeloue* etc.

(2) *Encyclopaed. Chirurg.* lib. 4. c. 6.

(3) Probabiliter haec uides non erat nisi apprensio; qua de re confirmari tanta magis videtur et *Flueneri* et aliorum sententia.

(4) Queritur an absolute et vere mortui dici possint, nec ne? . . .

(5) *Embryol. Sacr.* p. 72.

et tentantios congruas ad vitam excitandam sunt adhibenda cum plura hujusmodi supervisus esset. Foetus aliquos per operationem caesarem in lucem productos ad summam dignitatis gradum fuisse erectos tentantur exempla *Scipionis Africani* et *Mandi*, et juxta consilia etiam *Juli Caesaris*. Referunt quoque *Bartholomaeum Cordium De Lintigae* vulgo *ingentium* dictum fuisse, ex eo quod ex matris utero extractus esset. Idem fertur de *Santo Raymundo*, qui ideo nonnati cognomen habuit. Dein regem *Navarrae Sanctum*, matre a *Saracenis* inter vocandam per vulnus in ventre acceptam trucidata caeteram mensura ostentantem a superveniendi nobili *Genaro* extractum et eloculum escutitum fuisse, eumque postea de principis elevatione, discrepantibus precibus obtinuisse, contrariisq; adhaere (1). Dein etiam tentum embryo sit, aut mortuus foetus ascripto, aut datus graviditatis signa, operatio quoque negligenda potest: nam juxta *Nymmanum* (2): *prostat enim praeputia cadavera frustra incidere, quam semel permittere, ut foetus vivus in utero matris misere pereat*. Haec perpendenda antiquitas, ne foetus extincta matre et ipse periret, prudenter et optime constituit (3) — *quod mulier praegnantis mortua priusquam partus ei excidatur non sit expellenda: qui contra fecerit, apud amentis cum gravis poenitentia videtur* — Haec multum discepsata est et rigens nostra *Austriacae* Legislatio.

(1) *Guillelmus Oronius de Chirurgia* pag. 141.

(2) *In Tract. de vita foetus in utero* pag. 57.

(3) *Lib. XL Dig. Tit. 8. Lib. 2.*

Legem autem illam non solum per excellentiam regibus appellabant Jurisconsulti Saxoni Wirtembergensis etc., verum etiam quia a Numa Pompilio Secondo Romanorum rege sanctam fuisse creditur. *Mabius* enim ait (secundum vultum Sapientissimi Imperatoris Antonii Pii) annos arceat circa, quam mille occidere homines. Utinamque Siculus rex Carolus anno 49. aetuli elapsi per legem statuit « ut quævis pericula, ruias dolo, impedimento, » vel negligentia, cæcitate actum cum damno foetus amittatur, aut saltem retardetur, inque » semper cum malitia violentus abortus evenerit, » habeantur criminis homicidii pettores » (1). Dolendum sane, quod leges illae saluberrimæ humanæ pariter ac divine, non auctius ubique hodie coluntur, et in præci observantur: notandum tamen ut non semper certiorum consensum in moribus nostre necessarium esse, ut fortis salutis consuectur, hocque docet saluberrime observatio vel. *Rigodeaux* inserta in diar. erud. mensis Januarii 1749. quæ nunquam satis in memoriam revocari potest; scilicet « cum extra urbem (ille tempore » obstetricum magister) accersitus esset, ut partui » assisteret gravidæ, intranti domum, mortuam » enarrat puerperam, quod seminem foris » re potuerint, qui operationem cæcaream in » stitueret: ille listum, quo obvolutum erat appa- »rens cadaver, auferens, aliquem adhuc colorem » superalitem, et membrorum flacciditatem aboque » vitæ indicia vixit subistere, sanctum aliquid » presagium, cum iocitabatur, ut officium utri

(1) Ed. reperdet. *Congiarila* pag. 185.

» explorabat: hoc dilatatum et vesicam aquarum
 » bene formatam reperit, et disruptis membranis
 » foetus per pedes extraxit, et partum intravit,
 » et quatenus foetus mortuus apparet, mandet
 » tamen ne media non negligatur, quibus vita for-
 » tas et in matre et in foetu repita possit revocari,
 » et negotium commendat adiutibus mulieribus.
 » Non infructuose curandam fuisse conatus; nam
 » post paucas horas natum facilius *Rigobertus* (qui
 » mensae pectoris loci ipseus accumbere) quod
 » secutas viveret neque ac felici parte in haec
 » editus fuisset et grato hoc accepto matris vir-
 » tute recte valentem infanciam. Cum vero altera
 » vice mater litum adri juberet, et membra
 » ejus adhuc flaccida apparetent, adhuc adiatu-
 » ribus commendat, ut spiritum salis ammoniaci
 » adhiberent, molles cadaver ficerent, ab incoe-
 » pto non desisterent, nisi membra rigida appare-
 » rent; quo facto circa vespertin duabus horis post
 » matris decessum matrem velut a morte resusci-
 » tatum recognovit: accidit 8 septembria 1745;
 » mensis autem Augusti anni 1748. et mater, et
 » infans adhuc vivebant; mandit tamen mater sor-
 » de, paralytica et fere muta s. Patet ex hoc
 » semper, subquam in mortuis, aut asphycticis ad
 » operationem procedatur, cavendum uteri exploran-
 » dum esse, ut experiamur, an partus per naturales
 » vias absolvi non possit.

Tertius casus est, ubi vivente matre, ab par-
 tum per vias naturales impossibilem vitae matris pro-
 spicitur, et foetus per operationem caesariam a mor-
 tui-claustris eripitur. Poteest autem haec operationem
 salva manente matre et foetu, administrari multae
 historiae docent, et sic mater urgente necessitate

in operationem aeternam concessit testatur. *Gon-
giamile* (1) ejus inventorem, aut saltem restitui-
torem tribuit eidem *Jacopo Nuxero*, qui im-
partissimus Chirurgus circa annum salutis 1500
in propria uxorē jam mortū proximam eam suscep-
isse fertur tam felici cum eventu, ut postea ge-
mellos et quatuor adhuc infantis exire fecerit. Ex-
celsa vero infans primam aetate salutis 1577 diem
suam claudit. Hanc vero chirurgiam post singulari
studio exposuit, et modestius commendavit *Rou-
artus* (2): ne scilicet acutus solus palmam tantae
conductae obtineat, anno 1555 mense Octobri (3)
legitur quod foemina partum proprium, cultro ab-
moto exidere non fecerit, quae res certe mi-
seranda, incise utero, exivit cum foetu secundum.
An eorum foetus vitam possederit nec ne? De eo
alium in descriptione casus silentium: alio animo
haec praesatrix poenam luit ut gravem, acru-
mentem et dolorificam mortem. Quam fors in vita
conseruasset, si tractasset secundum methodum
saltem tunc *Rouartus* aut alioquin illo tempore
cognitorum: vitam enim protulit ad triduum.

Plures tamen haec operatio habuit aduersa-
rios ob infelicem quandoque eventum, cum per-
tinentis quoque et adstantes hanc operatorem saepe
non admittant, nisi dum jam vires soluant;
tuncque mors, si sequatur, adscribitur operationi,
qui alias vitari non pateret. Unde *Ambrosius*

(1) In *reperiet. Embryologia Secus* p. 93.

(2) In *Tristitiae de Phlegmatismo et ca-
limentis Caesariis* Paris 1581.

(3) *Observatio* 19a. *epistolae. Carolus*.

Partus concludit (1) ut id curationis genus, quod periculi et desperationis plenum est, nunquam suscipiendum esset. — Sic et *Mauriceau* scribit inuicem contra sectionem caecorum, quam nunquam in viri muliere tentandam esse docuerat (2) et in *Raportum* acerbissime invehitur egregius chirurgus *Le Moine* (3) sequentia dum habet. « Me-
« in ut approbarem crudelem hanc operationem,
« et animos adderem alii chirurgi ut illam
« tentarent ad exemplum *Rabau*, fuit ut pro-
« tester, me, licet versarer in tali cum, ubi cre-
« derem illam absolute necessariam esse, simulque
« adesse optimam spem felici successus, tamen
« nunquam illam tentaturum ».

At longe credidit videretur illa operatio, ubi caput infans in palvis angustis immobilis haerens, quoto jam die cultro discedit, cerebri par-tem eduxit; dehis manu in cernit crani immixta digitis prehensio cranio, eduxit infantem, membra adhuc (ben horrendum spectaculum!) motum: verum hodiebus acris et numerosis illustrata arte obstetricia observatis hanc operationem adhibendum esse videtur, cum unicuique auxilium aliquando sit, quo mater et foetus saluari possint. Ita celeb. *Simon* (4) 70 et ultra augeat facta, ubi in vita muliere hanc operatio cum summo momento fiat executioni mandata: historiae tamen decent, saltem in quibusdam institutis totius hanc operationem, dum adhuc alia in arte auxi-

(1) In lib. 23. De Generat. cap. 31. p. 704.

(2) Livre 2. Chap. 32. p. 342.

(3) Livre 4. Chap. 12. p. 328.

(4) In Acad. reg. chirurg. Paris vol. 1.

lia supererant; sic legitur ab concreta padeada ab-
domen dissectum fuisse gravidas ut foetus educe-
retur: sed certe iussu, cunctis, scalpello incisio-
nis ope hanc coarctationem tolli potuit. Eadem
operatio instituta legitur, dum matribus prodiret
infans duplicatus: notum autem est talem situm
infantis ab acta magistro nequidem inter laborio-
sas partes numerari, cum saepe facile de prodiret
iussu. Plures leguntur casus mulierum, quae se-
ctionem caesariam perierat, postea feliciter pepe-
runt, et aspicia quidem: certe in his non po-
tuit culpa nisi pelvis confirmatio, quae non
emendatur hac operatione: e contrario saepe fit,
ut foetus excludi plane nequeat, et haec quidem
partes praeternaturalem speciem pertractare mihi
scimus vel, in quibus necessitas erigit, ut foetus
exeretur.

In his prima ratio, quae sectionem caesariam
interdum arguit, est praeternaturalis pelvis angus-
tia. Dividitur haec juxta consuetudinem in relativam et
absolutam. Prima oritur ex volumine majorem foetus
transmittendi, et altera ex vitio pelvis. Ad sta-
tuendum juxta gradus varias causas et alterius
speciei, et determinandos effectus, quos habere
possunt, exacta pelvis affectus cognitio, uti et vo-
luminis foetus transmittendi haberi deberet, quod
impossibile est quantum ad ultimum cujus ca-
pitis extensio supponitur ordinarie ab una pro-
tuberantia parietali ad aliam 3. pelvicam et 6.
linearam. Absoluta pelvis angustia, de qua hic
potissimum agimus, incidit raro in omnes pelvis
partes; sed tantum quaedam partes pelvis con-
stituentes male conformantur.

Inter genera vitiorum pelvis enumerari so-

beat. — 1. Quando ossa pubis nimis rursus os sacrum ita pressa sunt, ut conjuncta apertura umbilicem minuantur, atque hocce modo utraque apertura angustatur; compressa in minori gradu sunt ossa pubis, in majori rursus os sacrum resumptum: pelvis haec compressa communiter vocatur — 2. Quando os sacrum cum ultima lumborum vertebra ad ossa pubis profectum singularem sinum acutum format, superioremque aperturam acriat. — 3. Quando inferior apertura angustatur ab ossa sacro et ossa coccygis; quando nimirum haec ossa interiorum viciis vergunt. — 4. Quando a lateribus inferior apertura ita premitur, ut sinis propinque sint lachrymarum tubum. — 5. Quando ossa sacri tuber in gibbosam formam in alterum latus vergit, quod ad majorem, vel minorem exortum in uno, alteroque pelvis osse emendatur, et caritatem pelvis angustat.

Jam dictis vitiis alia associari queunt (1): sed ut plurimum non efficiunt nisi introitum, vel exitum pelvis, et quidem ubi angustior est introitus, exitus largior est; et e contrario. Primum tamen frequentius obiciet quam secundum, et ordinarie vitium est in minori ossis pubis ab ossa

(1) Variis de causa videtur hujusmodi pelvis deformitas: aliqua cum tali vitio associatur: dein intergrum pelvis vitium, neglectum in juvenibus aliter exortum ab aliis non corrigi solet: expulsum tunc in diuturno aere in conjuncta angustatur, vel rursus aliter, aut scorbuto, aut venarum humorum corruptio mollem osseum efficit, et hinc pelvis compressam reddere potest. (Tract. Theor. et Pract. art. Obstructio. Auctore Gulielmo Smellie p. 74.)

sacro distantia, sine in diametro accideri, et quidem quandoque uno latere tantum et multo minus frequenter in diametro transversali. Contrarium saepe occurrit in exitu pelvis, nam frequentius nimis propinquus sunt ischioorum tubera, et arcus maximus pulvis non recte excavatus. Coeterum omnes illis rite constitutis, eo major partus difficultas laborior, quo major pelvis angustia, atque ita arcus pulvis ut minor diametrum, sine anterior non habeat 2 pollices et $\frac{1}{2}$; fortis exclusio qui ad ultimum terminum graviditatis gestatus est, impossibilis censeri debet, imo et partus naturalis quandoque fieri soquit cum diametro paulo majori jam dicto, tuncque aliqui praenatorum fortis exclusionem sollicitant et commendant, quod tamen ratio et leges praescribunt. Alii recurrendum habere ad symphysiotomiam (sectio pulvis). Nos autem nemini operationem Caesariam posse in hoc casu tuto adhiberi sustinemus, et quidem vidente cel. *Levret* (1) praestat instituisse viribus nec dum fractis, ubi aquae necdum effluerant, cum ille adhaec aequum mole distento, atque post sectionem contrahente osculo minor sectio sufficiat, quam eo jam constructo.

Mala pelvis etiam conformatio sola causam non est quae partum per vias naturales reddere potest impossibilem; sed etiam utriusque orificii vitia, quae ejus dilatationem necessariam impediunt, et arte chirurgica tolli non possunt, sunt adnotanda; ut tumores scirrhusi, et alii praeterea

(1) *Artis* p. pag. 227. In Sect. Genes.

si largam basin habent: arctior vaginæ si fuerit, vel si major orificii uterici resistentiâ obstruata, hæc vel per artum, vel externe coactis ut plurimum superantur.

CHARLES W. BRIDGES in sua *Arte Obstetricia* da una hujus operationis talia facit, e
 « L'operazione Cesareà è sì pericolosa che non
 « si deve intraprendere che nel caso in cui è
 « evidentemente indispensabile: ch'è ciò che gli
 « Ostetricanti non han determinato, in riguardo
 « alla estrema conformazione del bacino, se non
 « in una misura molto vaga, e molto incerta.
 « Essa non si deve praticar se non quando que-
 « sta estrema conformazione è tale che non lascia
 « alcuna speranza di condurre il fanciullo vivo
 « per la via naturale: ma non si deve adottare
 « per sola ed unica regola a questo soggetto
 « quella che il Celebre Levret ha stabilita: Fu-
 « d' uopo, dice' egli, per decidere sull'alta l'im-
 « possibilità del parto del fanciullo in vita che
 « la mano dell'Ostetricante non possa essere
 « introdotta nel collo del bacino per penetrare
 « in regola nell'utero, o che non la possa ar-
 « rotatamente ritirare allorchè ha preso uno dei
 « piedi del fanciullo. Sarebbe estremamente pe-
 « ricoloso di non aver altri dati che questi per
 « decidere dell'impossibilità del parto, e della
 « necessità dell'operazione Cesareà. Niente di-
 « scorrerà che una tale operazione non sia real-
 « mente indicata quando la mano dell'Ostetri-
 « cante non può trascurare il bacino della donna;
 « ma sarebbe assurdo il sostenere che non è re-
 « camente necessaria che in questo caso. La
 « mano la più grossa traversa liberamente un

« bucio, il cui ingresso non ha che due pollici
 « e mezzo di piccolo diametro, quando si dirige
 « metodicamente, ed un' altra più piccola po-
 « ta egualmente nell' utero, quantunque questo
 « diametro non abbia che due pollici; ma di
 « dieci mila fasciulli che s' intraprenderebbe ad
 « estrarre per una simil via, se ne sagrifiche-
 « ranno evidentemente dieci mila se sono a ter-
 « mine d' una grossazza ordinaria. Il bucio che
 « offriate tre pollici meno un quarto di diametro
 « lascia ancora nel poco speranza, che di 500.
 « fasciulli appena se ne salverebbero alcuni, e
 « forse ancora non archibero debitori che a quel-
 « la costituzione particolare (di aver cioè 3. pol-
 « e $\frac{1}{2}$ per piccolo diametro); ma sgraziatamen-
 « te è molto rara in simili casi di grande do-
 « formità del bucio
 « Noi crediamo perfettamente indicata l'opera-
 « zione Cesaree tutte le volte che questo diamo-
 « tro non ha che due pollici e mezzo di esten-
 « sione e (1).

Nunc ad alia vilis, quae Caesareana depo-
 scunt operationem; et inter haec raptura uteri
 est recensenda. Hoc infelix casus non adeo rarus
 est, cum celebri olim Parisiæ Artis Obstetriciae
 magister Gregoire (2) se triaginta annorum spa-
 tio decies sexties uteri rapturam observasse te-
 stetur: si fortas in utero quaedam partes affert
 per quas extrahi possunt, tunc operatio non ten-

(1) Oper. Cast. Trad. Leonardi Cantiliani. T. 3.
 p. 202, e seg.

(2) Hist. Acad. Roy. Scient. ann. 1724. Obs. Acad.
 N. 4 pag. 8a.

tanda est: licet enim Obstetrica manus dilacerationem uteri sentiat, illa tamen forte extracto foetu et contracto utero sanari potest; ipsa vero sectio Caesarea tantum instituida est, si foetus per dilaceratum iterum in abdomen penetravit, et partes ejus quae forte in utero adhuc subsistent, extractiones praestandae non sufficiunt: sed si considerentur symptomata pessima quae ut plurimum excipiunt uteri rupturam, ut animi deliquis saepe recurrentia; faciei pallor, oculorum exaratio, chlorelatio, aëres acrim, pulsus intermittens, radar frigidus, convulsiones, quae scenam non raro claudunt; quia in hacipiti adeo statim haec operatiorem mudebit, an quia Chirurgus illam in se facipit? . . . Unde si unquam profuerit, antequam illa symptomata pessima accesserint, institui debet; deo si jam jam rumpendi uteri signa arguant, largis V. S. et aliis frons tentatis sectio Caesarea: interuici foetus foret praeferenda.

Conceptiones ventrales in ovario et labis factae operationem haec interdum quoque exigere possunt. Verum, ut optime monet *Leuret* (1) ut gravis adeo operatio instituitur, certo constare debet, foetum non in utero, sed extra uterum haerere. — Signa conceptionis ventralis generalia cum reliquis graviditatis signis collimant; si vero tumor non in regione matricis, sed in vicina siue deprehenditur; si in orificio uteri nulla mutatio, graviditati contrariae observatur; si motus localis infans, inter corporis in abdomine separati

(1) *L'Art des Accouch.* p. 108.

percipitur; immo si ipsum corpus foetus tactu distinguere possumus, tunc nullum ferme dubium restat, foetum extra uterum esse positum, et sic materem per gastrostomiam esse liberandam, dum foetus ad pedes terminos gestatus apparuit.

Casum rarissimum alium pro sectione Caesarea fuit uterum in hernia sic adhaeserens, ut nullo ratione reduci in locum suum naturalem posset. Cuiusmodi caetoplam refert *Scriverus* (1), ubi in gravida muliere post acceptum gravem in sinistro inguine ictum, tumor eo loci apparuit, qui tantum abest, ut reprimi poterit, ut pedes in diu magis usque creverit, adeo ut uterus eam fere horizontalem obtinuerit. Cum igitur hinc sub conditionibus dolores partum foetus praevaleant non in pelvim, sed in lumbos impellant, neque in tanta uteri obliquitate necrum, vel instrumentorum auxilium esse possit, periculum est non dari aliam viam parturitionem ob eam liberandi, quam sectionem Caesaream. Si vero repositio herniae ante partum possibilia est, sicut in observatione a *Rapachio* (2) proposita contigit, tunc ad sectionem non progrediendum erit; sed foetus per naturalem viam excludendus est, nisi forte hac alia obstituerit impedimentis graviora. Haec impedimenta adducta a parte matris sunt; invenitur tamen et alia a parte infantis, in quibus tamen nonnisi urgente necessitate ad operationem Caesaream devolvendum est.

(1) *Institut. Pract. Medic.* lib. 4. part. 1. Sect. 2. p. 17.

(2) *Advers. dec.* 1. pag. 23.

Disputandum deinde foret an cum monstra bicorpora, vel triplica etc. in utero occurrant, operatio Caesarea instituenda esset, pectus et illa vira serventur, ea in lita, ut mater conservetur, instrumentis offensivis, et praesertim Kephilotomo, per vaginam in illorum corpus illata foret praecidendum, et membrum extenderetur per viam naturalem. Cel. Professor *Piatier* cum aliis in hinc circumstantiis pro Caesareis pugnat operatione; nam, ne de aliis innumeris dicatur exemplis, narrat eximius *Le Clerc Buf* fore usum mirandum duarum parvulorum simul constrictorum, quae vitam usque ad 23. annos duxer. Praeterea a contra Professor *Lavet* aperte declinavit in suis lectionibus Academicis ad monstri destructionem in utero esse faciendum, nam experientia docet, sit, quod talia monstra vivere non possunt generare vel brevissimo tempore; et nullas praeterea utilitatis sunt hujusmodi individua Patriae et societati, dum matrem servatam non instituta hysterotomy adhaec spes superest alios natos in lucem esse edituram atque magis utiles evasuros.

Sic pariter cum operationis Caesareae opem eximendi sunt duo fortas generi, primogeniturae Jus Civile sorte summo concedendum est ab Obstetricante, nempe primo qui ad exitum se peribet; atque clare sigae distincto, distinguitur ab illo qui in posterum exiit.

Enumeratis ita partus praeternaturalis speciebus, in quibus sectio Caesarea instituenda est, restat ut de ejusdem perficiendi methodo et loco verba faciamus. In primis quando instituitur operatio, vel grvida mortua est, vel dextra tantum

morte delinatur, vel vivit. Si sine dubio mortuus sit, et nullus artis magister praesens, quilibet quocunque, sine magna cautela adhibito, ventrem aperire debet, ut fortam in dia luminis aere proferat, et sacro baptismatis fonte abluat. Si naturae fieri fortis putetur, imperitus incisionem incipere potest prope Cordis acrobiculum, et aperto ibidem abdomine plagam ventris circa pubem extendere, donec venter in conspectum veniat, qui incidendus est eo modo, ut in vira dicitur: si vero minus maturus fortis, loco decliviori incisionem incipere potest, ut venter delegatur.

Ubi autem dubia mors, facto omni tentamine ad vitam excitandam quamvis locumtenens, oportet ut in vira procedere; nam si gravis aegri deliquitum mortem simulet, sub cultro vira reparare potest mulierem, et tunc operatorem minus caute procedere semper poterit. Uade olim recte Senatus Venetus edito statuit, ut in mortuis eodem modo operatio instituatur, ut in vira fieri consuevit, crucialesque prohibeat incisiones.

Ubi autem in vira muliere operatio instituenda est, quo melius ea succedat, sequentia notanda veniunt.

a) Omnis instrumentorum apparatus a gravidæ conspectu remotus ad manus sit, reliquaeque cautela in omnibus chirurgiae operationibus observandae minime negligantur.

b) Ne venter laesio distenda, et supra se pubis amens cultello secanti offeratur, latium ab aegra vel deponatur, vel cathedra edocatur.

c) Adhuc parati duo cultelli in suo manubrio firmati; scilicet unus cum lamina lata acu-

liniens acie convexa praedictas; et alias rectas cum lamina perangusta, cujus seminis principium globulo mucosum est, in hunc usum speciatim fabricati.

d) Praeterea lintamenta sua sint in promptu, quae ipsi mulieri subiacentur, et circumponantur, quo sanguis, qui promanabit, legatur, cujus etiam parva quantitas nequam profusionem solentat, et tam mulieri parvula quam adultantibus terrorem incutit.

e) Adhuc quoque fascia, splenia, stupae breves perae, pulvilli linteribus abdominis sub fascia adhaerendi, ut sanguis, atque humores in cavum abdominis effluentes versus vulvas dirigantur et exitus eorum facilitetur.

f) Delo paratae sint acies corvae filo serato instructae pro gastroraphia, et filum pro ligatura funiculi. Ulterius liquores parvos spirituosos, ut aqua vulneraria, colonica, vel mixtura excoctae-medysae ex aqua menthae piperinae, liquoris scordysae min. *Hoffmanni*, liq. c. c. *ascosmet* et laudan liquidum *Sydenhami* confecta, vel etiam spiritus rosae solus, vel camphoratus ad certam quantitatem aquae mixtus. — Denique antequam operationi se submittat gravida, indolio brevi anserina flos, secundum longitudinem induatur, et ponatur in lecto perangusto et elevato, ut artis magister et ministri libere operentur. Cum autem in ipso lectulo aliquo tempore morari debeat, ut quiescat post operationem, culcita sit stratis sufficiente lintamentorum numero, ut sanguine et aqua madida extrahi possint, ut siqua et munda servetur pauperi, supra transversam lecti cervical suslaccetur lumbi, ut magis extrorsum promi-

neat abdomen: decumbat in dorso erubus et femoribus extensis tempore operationis, et semiflexis quando fortas extrahatur.

De loco ubi incisio instituenda inter auctores dissidium est, et viz ullus in abdomine locus est ubi non fuit instituta operatio. Multi in parte laterali abdominis scotere, alii transversaliter aut supra, aut infra umbilicum, et quidam in linea alba incisionem instituere. Inter primos aliqui fuisse qui fecerunt incisionem oblique descendendo ab extremitate cartilaginea tertiae costae spuriae versus pabem; alii vero arcuatam locutionem praestulerunt. Cel. *Leuret* commendabat incisionem parallelam ad crura externam musculi recti abdominis; sed ita ut aequaliter a musculo recto et ab linea ducta ab extremitate tertiae costae spuriae ad apicem superiorem omni illi distaret: omnes aut in latere dextero, aut sinistro pro vario viscerum abdominalium situ secundum eum nascerentur. Uterius consulit celeb. *Leuret* ne locus incidatur uteri ubi jundat insertam esse placentam huic vel illi cotocorum uteri parti; pluraque esse dubia et incerta; unde si lateralia incisio fieri preferenda abdominis in latere, in quod uteri fundus magis inclinet, ceteris partibus esset instituenda, ut melius in conspectum venisset uterus: non vero jundamque laterem esse sectionem in linea alba, sive potius in aperturam media inter musculos rectos, quae magis externa est ultimis graviditatis temporibus, ut musculus recti quidem magis a se mutuo distaret.

Antequam se submittat grvida operationi in caso, ubi praevideatur operatio necessaria, sanguis uterinarum mittatur, primae viae a crudi-

tutibus, et intestina a foecibus liberentur; dein balnea quoque praemitti possunt, quae otiosa non nisi magis felicem operationis successum praemittere possunt; sed dolendum quod plerumque accipius argui debent, cum mulier, antequam de operatione cogitetur, jam saepe fatigata valde sit, et genitalia irritata, contagia per imprudentem manuum admotum.

Faeculina in conveniente situ posita, operator manu (1) dextera tenens hysterotomum cum acie convexa incidet tegumenta et pinguedinem, donec in conspectum veniat splanchnica quae constituit lineam albam; hanc caute et prudenter incidet ut peritoneum detegat, levis tunc plaga peritoneum infligitur, in hoc digitum indicis manus dexteræ immittit, hujusque ductu vulnus, quantum necesse est, dilatabit. Ad hanc perficiendam incisionem quae cunctis rectae cum rotunda, aut globosa cuspidis est praeferenda: extendatur vulnus ab umbilico usque ad pollicem cum dimidio super symphysin osseam pubis: tutius inciditur a superiori parte versus inferiora, quam e contrario. Cum inciduntur abdominis tegumenta, adjutor fixus tenet in medio abdominis iterum, levi flecta ambobus manibus latera abdominis premunt, dum alius similem faciet pressionem super umbilicum, ut aliquo modo ubi fundus deprimatur, et impediatur intestinorum per vulnus prolapsum; clipes vero refluuntur, et ab eductante confluuntur. — Aperto, ut decet, abdomine, in ejus cavitate haerens foe-

(1) V. Bandage des Omb.

que mora estimatur et plaga in lobum vel in ovarium maxime cum moderacione continetur, si hinc in partibus foetus continetur. Ubi vero in utero sedem habet, depressa per adjutorem uteri fundo, ut sit ad libellam cum angulo superiori vulvaris, cum utero cultello acie convexa praedito in media superficie ea dexteritate incidatur ut foetus vulveretur, externa scilicet plaga in parte anteriore fere a centro fundi ad duos saltem pollices supra orificium externum uteri, ut adeo sectio non extendatur ad orificiū uterini aperturam lateralem, quam ipsam cavitationem uteri respicit. Apparentibus membracis evi parva plaga indiget, et digitus imminetur, ejusque ductu cultello summa cura cautela vulva extendatur incidendo ab interiori parte versus exteriora: incidi debent quoque placentae si in eam fortuito sub acie cultelli detegeretur, nisi margo in vicinis vulvaris foret, et tunc expediat ut digitus separatur.

Incisio uteri ad longitudinem 5. vel 6. pollicum pro extrahendo foetu plerumque sufficit: generatim praeulat paullo majorem forem incisionem, quae tamen parvam, quae et longior esse debet, si aquae jam dudum effluerint. Dicta incisio ut ad libellam cum angulo superiore vulvaris inseguentiorum, et terminatur saltem ad pollicem cum dimidio supra angulum inferiore vulvaris externi. Aperto convenienter utero, introducitur manus ut quiescant pedes foetus, et hic eo fere modo ut in partu naturali agripparum fieri solet, invertatur et extrahatur. Foetu ad axillas naque educto, si major capitis moles fuerit, brachiis retractis, et uno aliove digito in os

foeta, immisso, dum altera manus supra humeros ita fertur, ut utraque colli regionem hinc digiti comprehendant, caput hinc inde agitando et attrahendo solvere conatur. Ubi vero caput primo per inflectum valvæ argetur, tunc prius educendum, et utrisque manus indicem infra angularem maxillæ inferiorem insertando attrahatur. Extracto foeta, manus in uterum immittitur, et placenta separatur, et grani quoque sanguinis educuntur, et digitus in collum uteri immittitur ut aperiat et grani sanguinis ostium occludentes auferantur, ut ne haemorrhagiarum fluxus via paratur.

Si uterus, extracto foeta et placenta, nullis subsistat, neque non contrahat, externæ medicæ irritetur, ut fibres in contractionem abripiantur. Quando in media parte anteriore uteri facta est sectio, nisi offundatur placenta, generaliter periculosa hæmorrhagiæ notabilis vix habetur; si tamen supervenerit, quæ aliquam mentem incuteret, labile vulnus aqua frigida admovetur, quæ modico spiritus vini vel aceti in se recipit; si autem aliquot post operationem diutius sanguinis abundanter fluxus supervenerit, iterum haemorrhibus attenuatis actio uteri excitatur: hinc proderit aquæ frigidae puræ, vel cum modico aceti injectio; locus uteris per interna remedia roboretur; effusus in abdomen sanguis vel aliuæ egres, vel facta supra abdominalia latera pressio educatur.

Aliqui etiam injectiones aquæ tepidæ adhibuerunt, ut viceram superficiem sanguine liqta abluatur. Eandem injectionem per valvæ in decursu factas ut et in ostium uteri, et orificium uteri servetur apertum, utiles esse possunt.

Uteri tandem valvæ vix habenda ratio est

cum parca post morsa ultra medietatem minuatæ, et viribus astutæ consolidetur. Abdominis autem valvas fascia uniante ita constringatur, ut in sede inferiori hæmoribus effluxus concedatur; aer a vulnere arceatur; saturam infundere, quinquam absolute necessarius non sit, tutum est. Coeterum aliquot ab operatione elapsis horis anhel iterum tollatur ligas, quia, si opus est, suturas eo scopo solvantur, ut vulnera examinari, et effusi sanguinis thrombi extasi possint. — Reliquæ perficiantur ex generalioribus, quibus graves vulnere abdominis (1) maxime diriguntur regala.

(1) V. Monteggia in Gastronphia etc.

FINIS.



THESES DEFENDENDAE.



I

In errore versantur qui credunt, delirium semper ex congestione aut inflammatione cerebri vel ejusdem membranarum oriri.

II.

Experientia docuit, pueros aetate sextum annum attingentes delirio laborasse.

III.

Hydrocephalus acutus infantum nil aliud est quam ipsorum meningo-cephalitis effectus.

IV.

Causa proxima lithiasis vesicalis est quaedam conditio morboſa capillarum renum, qua organa haec humorem accernunt, cujus principia constitutiva differunt ab illis, unde in statu aetatis urina constituitur.

